

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG**  
**RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN,**  
**LÙN XOẢN LÁ CÁC TỈNH PHÍA NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **31** /BNN-BVTV-BCĐ- TB

V/v: Tình hình dịch rầy nâu, bệnh  
vàng lùn, lùn xoắn lá

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2008.*

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Nam

### 1- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Theo báo cáo của Chi Cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía Nam, đến ngày 06/03/2008 lúa Đông Xuân 2007-2008 đã xuống giống khoảng: 1.582.689 ha, ở các giai đoạn: Đẻ nhánh 20884 ha; Đòng trổ 245.089 ha; chín 802.117 ha; Đã thu hoạch: 530.599 ha.

Lúa Hè Thu sớm 2008 (Xuân Hè) đã xuống giống 69.615 ha, ở các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang.

### 2- TÌNH HÌNH RẦY NÂU - BỆNH VL&LXL

#### 2.1 Rầy nâu:

Trà lúa Đông Xuân: Diện tích nhiễm rầy nâu là 66.225 ha, tăng 6.286 ha so với tuần trước, phần lớn diện tích nhiễm ở mức độ nhẹ. Mật số rầy nâu phổ biến 750-2.000 con/m<sup>2</sup>, có 3.252ha mật số rầy cao 5.000-10.000con/m<sup>2</sup>. Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến rầy cám tuổi 1-3. Diện tích phun trừ rầy nâu trong tuần 17.749 ha.

Trà lúa Hè Thu sớm: rầy nâu xuất hiện trên trà lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, trong tuần có 8.042 ha nhiễm rầy nâu, tăng 1.129 ha so với tuần trước. Rầy nâu phổ biến rầy cám tuổi 1-3 và rải rác rầy trưởng thành, mật số phổ biến 500-1.000 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 3.000 con/m<sup>2</sup>. Diện tích phun trừ rầy nâu trong tuần 446 ha.

#### 2.2 Bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá:

Trên lúa Đông xuân: Hiện chỉ còn 3,6 ha lúa bị nhiễm bệnh, tỷ lệ bệnh từ 2-20% tại tỉnh Lâm Đồng.

Trên lúa Hè Thu sớm chưa thấy xuất hiện bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.

### 3. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương tổ chức thường xuyên, liên tục kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát tình hình rầy nâu ngoài đồng, đồng thời vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tự phun thuốc tại các vùng có mật độ cao.

#### 4. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- Rầy nâu đang tiếp tục nở rộ. Đối với các trà lúa từ 40 đến 55 ngày tuổi nếu ruộng lúa có rầy cám nở với mật số cao nên phun thuốc diệt rầy dạng chống lột xác để hạn chế sự tích lũy mật số rầy nâu ở giai đoạn sau. Đối với các trà lúa trở đều đến chín cần hạn chế tối đa việc phun thuốc hoá học vì rất khó diệt được rầy nâu khi cây lúa đã trở và như thế việc phun thuốc sẽ không có hiệu và có thể gây ra tình trạng cháy rầy. Khuyến cáo nông dân không nên sử dụng các loại thuốc trừ rầy có hoạt chất Acetamiprid trong giai đoạn từ lúa trở trở đi.

- BCD các tỉnh khuyến cáo nông dân nên thăm đồng thường xuyên, đặc biệt là trên các trà lúa đẻ nhánh đến đòng cần quan sát kỹ dưới gốc lúa phát hiện kịp thời rầy nâu; chỉ phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám tuổi 3-4 cao quá 3 con/ tép(đánh) lúa; không nên xử lý thuốc tùy tiện, nhất là phun ngừa, để gây bộc phát rầy, ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch.

- Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Công điện số 16 ngày 04/3/2008 của Bộ trưởng về việc gieo sạ lúa vụ Hè Thu sớm. Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đền tại địa phương để đảm bảo xuống giống né rầy thành công; tránh gieo sạ rải rác, nhiều trà lúa trong một khu vực để phòng ngừa tốt sự lây lan của dịch bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá cho lúa trong vụ Hè Thu sắp tới.

- Duy trì chế độ báo cáo trước 17 giờ hàng ngày về Trung Tâm BVTV Phía Nam để tổng hợp và BC bộ kịp thời.

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo)
- BCD của Bộ NN-PTNT
- Chi Cục BVTV các tỉnh, thành (thực hiện)
- TT BVTV PN (để chỉ đạo)
- Cơ quan thông tấn, báo chí (để đưa tin)
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG BAN**

**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Huân**